

Godkänt: 2025-03-25  
Giltigt t.o.m: 2028-03-25Ver.nr: 2.0  
Dnr:

## Röntgen cholangiografi primär peroperativ remittent

---

### Dosklass II



Dosklass II: Extra hänsyn till strålrisk för barn.

### Indikation/frågeställning

- Klarläggande av anatomi
- Vidgade gallvägar
- Konkrement
- Kontrastpassage till tarm
- Tumör

### Kontraindikation

Kontrastmedelsöverkänslighet relativ kontraindikation. Premedicinering.

### Remissinnehåll

- Remiss måste finnas på röntgenavdelningen innan undersökningen utförs
- Typ av operation-laparoskopisk eller öppen
- Kända konkrement. Gallstas. Cholecystit. Tumörmisstanke. Tidigare utförda operationer. Avvikande laborationer.

### Patientförberedelser

Kateter insatt via ductus cysticus peroperativt. Laparoskopiskt eller öppet.

### Kontrastmedel/läkemedel

Vattenlösligt jodbaserat kontrastmedel. (Se vidare om kontrastmedelsreaktioner i Kontrastmedelsöverkänslighet)

### Utförande

Patienten undersöks på operationsbordet. Kirurg injicerar kontrast via inlagd kateter. Bildserier sparas till PACS av kirurg som kontaktar röntgen. Ibland upprepade undersökningar, eventuellt efter inläggning av kateter i ductus choledochus. I Mora utförs denna us helt självständigt av opererande kirurg. Undersökningen dokumenteras i kirurgjournalen.