

Godkänt: 2025-03-25  
Giltigt t.o.m: 2028-03-25Ver.nr: 3.0  
Dnr:

## Röntgen halsrygg bröstrygg ländrygg remittent

---

### Dosklass I, hals- och bröstrygg. Dosklass II, ländrygg



Dosklass I och II: Extra hänsyn till strålrisk för barn.

### Indikation/frågeställning

- Förekomst av kotkompression. *Ålder kan vara svårvärderad*
- Spondylos. *Degenerativa förändringar är dock vanliga och ej specifika. Dåligt samband mellan fynd vid röntgenundersökning och ospecifik ryggsmärta*
- Ankyloserande spondylit. *Diagnoskriterier baseras dock på SI-lederna*
- Missbildningar
- Skolios
- Fraktur. *Utreds i första hand med DT, särskilt efter trauma*
- Destruktion. *Utreds i första hand med DT eller MRT då förändringar i tidigt skede är svåra att påvisa med konventionell röntgen*

### Kontraindikation

-

### Remissinnehåll

Uppgift om typ av trauma samt lokalstatus. Yttre felställningar. Neurologiska bortfall. Laboratorieparametrar tydande på inflammation eller infektion. Maligna tecken.

### Patientförberedelser

Ytliga främmande föremål tas bort, t.ex. smycken.

### Kontrastmedel/läkemedel

-

### Utförande

Halsrygg, liggande eller sittande i 4 projektioner. Bröst- och ländrygg, 2 projektioner i liggande. Det ingår en översiktlig bedömning av SI-leder på L - 5 frontalen SI-leder med invinklade bilder beställs separat.

Vid skoliosundersökning på barn och ungdomar utförs stående undersökning för bedömning av skoliosvinklar enligt Cobb.

## Eftervård

-

---