

Godkänt: 2025-04-04
Giltigt t.o.m: 2028-04-04Ver.nr: 2.0
Dnr:

Röntgen hypopharynx esofagus remittent

Dosklass II



Dosklass II: Extra hänsyn till strålrisk för barn.

OBS! Nyttillkomna sväljningsbesvär skall i regel primärt utredas med gastroskopi i SVF-tempo

Indikation/frågeställning

- Främmande kropp
- Sväljningsdysfunktion
- Striktur
- Motilitetstörning
- Divertikel
- Tumör
- Perforation Datortomografi

Kontraindikation

-

Remissinnehåll

- Anamnes och status. Vilka sväljningsbesvär. Smärtor. Felsväljning. Reflux till näskaviteten
- Aktuella och tidigare utförda operationer. Typ av främmande kropp. Har ventrikelsond kunnat sättas

Patientförberedelser

-

Kontrastmedel/läkemedel

- Bariumkontrast
- Vattenlösligt jodbaserat kontrastmedel vid perforationsmisstanke, misstanke på atresier-fistlar och vid aspirationsrisk (se vidare om kontrastmedelsreaktioner i Kontrastmedelsöverkänslighet)

Utförande

Bariumkontrast. Rörlig sekvens och/eller enstaka bilder under och efter kontrastbolus. Patienten undersöks stående. Om reflux- och motilitetsfrågeställning även undersökning i liggande.

Vid atresifrågeställning på nyfödda nedläggs sond till hindret och via denna vattenlöslig kontrast i liten mängd. Utförs bara i Falun.

Eftervård

-
